

Kryolipolýza Kontraindikácie

- Problémy s črevami
- Raynaudova choroba (nedokrvovanie končatín)
- Hematická choroba (chronické ochorenie kĺbov, svalov, šliach a mäkkých tkanív)
- Hypoalbuminémia (problémy s pečeňou)
- Ťažké popáleniny
- Ťažká cukrovka
- Starší ľudia a deti
- Ľudia náchylní k omrzlinám

Kavitácia kontraindikácie

- nie je určená pre ľudí s ochorením srdca a pre tehotné ženy
- nie je tiež možné ju vykonať u ľudí, ktorí majú kardiostimulátor či iné kovové implantáty
- Po pôrode sa odporúča so zákrokom počkať aspoň 3 - 4 mesiace a po cisárskom reze približne 6 - 7 mesiacov.
- Hepatitída akéhokoľvek druhu
- Zlyhanie obličiek
- Choroby imunitného systému, pozitívny nádorový marker
- Fibromyóm (maternicové myómy)
- Prítomnosť implantátov
- Osteoporóza
- Porucha krvácania
- Diabetes
- Chronické infekčné choroby
- Užívanie nesteroidných liekov 10 dní pred kavitáciou

Rázová vlna sa neodporúča:

- Poruchy zrážania krvi
- Psychické poruchy
- Onkologickí pacienti
- Tehotenstvo (v blízkosti plodu)
- Nad nervom a kľúčovými žilami
- Pri liečbe kortikoidmi v posledných 2 dňoch
- Pri RTG terapii
- Nesmie sa aplikovať nad oblasťou pľúc a čriev

Upozornenie!!!Pokiaľ máte v tele kardiostimulátor alebo iné mechanické zariadenie na podporu Vašich životných f., obstarajte si potvrdenie o testovaní kompatibility s rázovou vlnou u svojho lekára!!!

Lipolaser kontraindikácie

- Závažné ochorenia obličiek a čriev
- Vysoký krvný tlak
- Nádorové ochorenia
- Chemoterapie
- Obdobie do 1 roku po úspešnom ukončení chemoterapie

- Zápaly žíl a hlboké žilné trombózy
- Hemofília (slabá zrážanlivosť) a zvýšená krvácavosť
- Žalúdočné vredy
- Diabetes
- Tehotenstvo a kojenie

Rádiofrekvencia kontraindikácie

- Herpes
- Srdcové ochorenia, kardiostimulátor
- Poruchy zrážanlivosti krvi
- Tehotenstvo a kojenie,
- Rakovina
- Poruchy činnosti pečene a obličiek, poruchy metabolizmu
- Ochorenia spojivových tkanív a nervovo-svalového ochorenia
- Kovové protézy, implantáty, vnútro maternicové kolieska a piercing v ošetrovanej oblasti
- Vyhybajte sa miestam s materskými znamienkami
- Botulotoxín menej ako 1 rok od aplikácie
- Akútne infekčné procesy, zápaly, poranenia, alergie

Lokálna kryoterapia kontraindikácie

- Netolerancia a alergia na chlad
- Podchladenie organizmu
- Raynaudova choroba
- Miestne poruchy prekrvenia
- Chudokrvnosť
- Užívanie niektorých liekov – neuroleptík a alkoholu
- Znížená funkcia štítnej žľazy

Bioptron lampa kontraindikácie

- Nie je vhodné aplikovať 4-6 mesiacov po rádioterapii
- Epilepsia
- Nie je vhodná u onkologických pacientov s nádorovými ochoreniami
- Nie je vhodná na použitie na očnú sietnicu
- Hyperfunkcia štítnej žľazy

Lymfodrenáž

- Pri ochoreniach dýchacích ciest (astma) a akútnom infekčnom ochorení (chrípka)
- Pri kožných ochoreniach a na otvorené rany
- V prípade neliečeného vysokého tlaku
- V prípade zvýšenej funkcie štítnej žľazy
- V prípade srdcových chorôb a ochoreniach pľúc, pečene a obličiek spôsobených opuchmi pri onkologických ochoreniach
- Pri neurologických ochoreniach (napr. epilepsia, neuropatia)